



Правилна нега пред пресушување



Пишува: дипл. земјод. инж. Слободан Серафимовски

Кога кравата е пресушена го одмора вимето, а воедно го обновува и подготвува за следната лактација по отелувањето.

Зошто се одмора вимето?

Во време на лактација, вимето е многу оптоварено. За една крава да даде 20 литри млеко мора низ вимето дневно да се „преработи“ 7.000-8.000 литри крв. Затоа, неодморено (уморно) виме или виме кое го молземе до крај во наредните лактации ќе ни даде и до 30% помалку млеко.

Пример: Одбираме една крава од нашата фарма која дава просечно 15 литри млеко на ден. Ако е сè нормално, кравата треба да се засуши на приближно осум литри млеко и 60 дена пред очекуваното отелување. Но, ако ја молземе до 20 дена пред отелувањето и ја храниме како другите крави, правиме голема грешка и во следната лактација производството на млеко може да се намали и до 1.200 литри. Тоа значи наместо 4.500 литри млеко од истата крава ќе добиеме 3.300 литри млеко. Ако цената на еден литар млеко е 18 денари, би дошло 21.600 денари помалку, но ако на тоа се додадат околу 2.400 денари субвенции, ќе имаме вкупна загуба од 24.000 денари годишно.

Правила кон кои треба да се придржуваме:

Пред пресушувањето треба да се знае:

1. Да се грижиме за правилната кондиција на кравата;
2. Редовно да се водат податоци за припустот;
3. Да се пресуши на 60 дена пред телење;
4. Пресушените крави задолжително да се одвојат од другите крави во шталата;
5. Пресушувањето да трае што пократко;
6. Добро е превентивно да се користат антибиотици при пресушувањето (во моментот на пресушување да се даде антибиотик, а потоа да не се молзе кравата);
Од моментот на пресушување до 14. ден пред отелување не треба да се дава квалитетна храна.
7. Кравата треба да се храни како да дава 4-6 литри млеко на ден;
8. Да се намали количеството на сочни крмива (силажа, сенажа) на околу 12-17 kg на ден. Ако кравите се на паша, пресушените крави може да се одвојат на пасиште со послаб квалитет;
9. Да се намали количеството на концентрирани крмива (смески) до максимум 1 kg на ден. Доколку имате квалитетна силажа и сенажа, не е потребно да се дава смеска од концентрат во храната, а доколку силажата и сенажата се со послаб квалитет, тогаш се додава препорачаното количество концентрат;
10. Да се дава сено со послаб квалитет, па дури и слама;
11. Да се додава минерално-витамински додаток за крави во пресушен период. Добавокот би требало да содржи помалку калциум, а повеќе магнезиум и фосфор; Од 14 дена пред отелување до отелување и околу отелувањето треба да се дава квалитетна храна.
12. Да се остане на истото количество квалитетни и сочни крмива (силажа и сенажа);
13. Да се зголеми количеството на квалитетен концентрат (смеска) од 2 до 3 kg на ден;





14. Квалитетно сено да се дава по желба по хранењето на кравите со основен оброк од паша, силажа или сенажа;
15. Две недели пред отелувањето добро е на кравата да и се даде доза од селен и коктел од витамини А, D₃ и Е (со инјекција);
16. Еден до два дена пред отелувањето да се додаде минерално-витамински додаток (додаток за крави во производство на млеко). Се додава поголема доза на калциум (100-200 г/ден по крава), особено за постари и високопроизводни крави (3-4 лактации) по-

ради опасност од појава на млечна грозница која најчесто се јавува 12 часа пред отелувањето и 72 часа по отелувањето;

17. Во овој период да се понуди на кравата оброк кој ќе биде основа за оброкот во периодот по телењето (ако е можно оброкот да биде смеска од силажа и сенажа);
- По отелувањето
19. Кравата е способна и желна за јадење повторно по 6-8 часа по отелувањето;
20. Тоа е многу важен период во производниот циклус на млеко, кога кравата мора да се храни правилно и со квалитетна храна;
21. До 14 дена по отелувањето на кравата треба да и се дава оброк со ист состав каков што сме и давале и пред отелувањето. Квалитетот и количеството на оброкот за тоа време би требало да го задоволува просечното производство на млеко на таа крава;
22. Две недели по отелувањето треба да се зголемува количеството на оброк;
23. Триесеттиот ден по отелувањето кравата започнува да го зема целосниот оброк и тој треба да се дава најмалку уште четири месеци;

Општо

1. Да не се здебелува кравата во периодот на пресушеност (дебела крава не е мерка на успех, особено во производството на млеко).
Кај дебелиите крави, познати и докажани се следните проблеми:
 - тешки отелувања (замастување на породилните патишта),
 - помало производство на млеко во првите месеци на лактација,
 - намален апетит,
 - намален имунитет (кетоза, синдром на дебели крави);
2. На кравите подобро е да им се зголеми оброкот во последната фаза на лактација отколку да се зголеми оброкот за време на периодот на пресушеност;
3. Да не се форсира кравата со максимален оброк веднаш по отелувањето (кравата не е во состојба да ја искористи хранливата вредност на целосниот оброк ниту има апетит да го изеде);
4. Нормално е по отелувањето кравата да изгуби одредена тежина - ослабнувањето не е знак на болест.

ВАЖНО: СЕКОЈА ПРОМЕНА НА КОЛИЧЕСТВОТО И КВАЛИТЕТОТ НА ОБРОКОТ ДА СЕ ПРАВИ ПОСТЕПЕНО (минимално на седум дена)!

finance
central
europe

THE BEST INSURANCE COMPANY IN MACEDONIA 2004
THE BEST INSURANCE COMPANY IN MACEDONIA 2005
THE BEST INSURANCE COMPANY IN MACEDONIA 2006
THE BEST INSURANCE COMPANY IN MACEDONIA 2007
THE BEST INSURANCE COMPANY IN MACEDONIA 2008

ВАРДАР
ОСИГУРУВАЊЕ

Член на Групацијата **triglav**

**ОСИГУРАЈ ГО СВОЈОТ КАПИТАЛ,
И ПРЕПУШТИ ГО ВО СИГУРНИ РАЦЕ!**